



Collection CÉPAGE

Merlot

Levadura enológica *Saccharomyces cerevisiae*

Resalta el carácter varietal del Merlot.

Origen

Cepa n° 4882 seleccionada en la Region de Burdeos por ITV France con la participación de CIVB-Burdeos.

Aplicación

Collection Cépage Merlot® es una levadura específicamente escogida para una vinificación óptima en tinto de la cepa Merlot.

Permite obtener vinos redondos y expresivos con taninos suaves y notas aromáticas complejas (cereza, frambuesa, mora, ciruela y especias).

Propiedades enológicas

■ Cinética de fermentación

- Fase de estado latente reducida, cinética rápida y regular.

■ Rendimiento azúcar/alcohol

- 16,5 g de azúcar por un 1 % de alcohol.

■ Características tecnológicas

- Intervalo óptimo de temperatura: 25 a 30 °C.
- Poder alcoholígeno: 14,5 %.
- Resistencia al SO₂ libre: 50 mg/l.
- Baja producción de espuma.

■ Características del metabolismo

- Producción alta de glicerol, 5 a 9 g/l.
- Producción de acidez volátil baja, generalmente inferior a 0,2 g/l.
- Producción de acetaldehído baja, inferior a 25 mg/l.
- Producción de H₂S baja.
- Producción de SO₂ baja, inferior a 10 mg/l.

■ Favorece la extracción de polifenoles y macromoléculas que producen vinos densos redondos y equilibrados.

■ Se obtienen muy buenos resultados sobre tempranillo, Sangiovese, Grenache.

■ Fenotipo: neutro con factor killer.

Dosis de empleo

Collection Cépage Merlot® contiene 10 mil millones de células activas secas por gramo.

Dosis recomendada: 20 g/hl.

Envasado

Collection Cépage Merlot® viene ensavada al vacío en paquetes de 500 g.

El almacenamiento debe efectuarse en su envoltorio de origen cerrado, en local fresco (5 a 15 °C) y seco.

Modo de empleo

Siembra de 50 hl por dosis de 20 g/hl

Protocolo de rehidratación



Verter en un cubo limpio 10 l de agua potable a 35 - 38 °C. Evitar las aguas cloradas.



Añadir 500 g de azúcar (o 4 l de mosto templado) y mezclar. En efecto, en un medio azucarado al 5 % las levaduras se rehidratan mejor y empiezan a multiplicarse.



Verter 1 kg de levaduras en la solución de rehidratación, sin dejar de agitar con vigor para ponerlas progresivamente en suspensión.



Dejar hinchar el fermento durante 30 mn. Se produce una espuma olorosa, señal de la vuelta a la actividad de las levaduras. Homogeneizar antes de la incorporación.

Fase de incorporación

La incorporación de levaduras rehidratadas tiene que tener lugar lo antes posible con el objeto de limitar la proliferación de la flora contaminante.

Para evitar un choque térmico durante la siembra, la temperatura del fermento obtenido tras la rehidratación se reducirá por adición progresiva de mosto a fermentar (1 a 2 adiciones).

La siembra (manual o con bomba dosificadora) se hará al encubar. Un remontado con aireación favorece el reparto del fermento en la cuba y una buena oxigenación del medio.



Gestión de la fermentación



Tras la siembra con las levaduras, el control de densidad del mosto permite un seguimiento diario del desarrollo de la fermentación. Es importante respetar el intervalo óptimo de la temperatura específica de la cepa. Se aconseja también prevenir las dificultades de fermentación gracias a una aireación y un aporte en mitad de la fermentación de un biorregulador de fermentación, MAXAFERM® a base de levaduras inactivadas, de tiamina y de sales de amonio.

A pesar del continuo esfuerzo para asegurar que la información proporcionada en este documento sea correcta, ninguna parte incluida en él deberá ser interpretada para implicar una representación o garantía con respecto a la exactitud, actualidad o integridad de dicha información. Se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Por favor, póngase en contacto con nosotros para solicitar la última versión de este documento o para obtener más información.

SU DISTRIBUIDOR